

Programme de ressource de sensibilisation clinique et d'éducation C-A-R-E^{MC} pour ABSORICA LD[®] (isotrétinoïne) : Liste de contrôle pour le dépistage psychiatrique

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Ce matériel a été développé par Sun Pharmaceutical, dans le cadre du plan de limitation des risques d'ABSORICA LD. Ce matériel n'est pas destiné à être utilisé à des fins promotionnelles.

Nom du patient : _____

Date : _____

Nom du médecin : _____

L'évaluation psychiatrique doit faire partie de l'évaluation mensuelle pendant le traitement par ABSORICA LD. Tous les patients doivent signer le consentement éclairé du patient, qui est disponible sur le site Internet d'ABSORICA LD à www.ABSORICALD.ca/fr/ ou en appelant le numéro gratuit 1-833-388-0532. Des cas de dépression et de risque de suicide ont été signalés pendant et après la thérapie. Chez certains de ces patients, la dépression a disparu à l'arrêt du traitement et est réapparue lorsque le traitement à l'isotrétinoïne a été réintroduit. Une instabilité émotionnelle a été rapportée avec l'isotrétinoïne.

Si des symptômes de dépression apparaissent ou s'aggravent au cours du traitement, le médicament doit être arrêté rapidement et le patient doit être orienté vers un traitement psychiatrique approprié. La monographie complète du produit et les renseignements sur la médication à l'intention des patients peuvent être obtenus sur le site Internet d'ABSORICA LD à www.ABSORICALD.ca/fr/ ou en appelant le numéro gratuit 1-833-388-0532.

Avant de prescrire ABSORICA LD, il faut procéder à une évaluation minutieuse de l'état mental du patient, en vérifiant notamment s'il a des antécédents **personnels ou familiaux** de maladie psychiatrique.

Il peut être utile pour les médecins d'effectuer un dépistage avant de prescrire ABSORICA LD et/ou de surveiller les patients pendant le traitement par ABSORICA LD à l'aide des outils disponibles. Le questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9) est fourni dans ce dossier à titre d'exemple d'outil. Veuillez noter que ce questionnaire n'a pas été validé spécifiquement pour les patients prenant de l'isotrétinoïne dans des produits pour le traitement de l'acné. Les données du PHQ-9 sont destinées à faciliter l'évaluation de l'état de santé mentale de votre patient. Les résultats du questionnaire, ainsi que d'autres informations cliniques, peuvent être utilisés pour modifier le traitement ou orienter les patients vers une consultation psychiatrique, à la discrétion du clinicien et au cas par cas. La gestion de la dépression détectée par le dépistage est laissée à l'appréciation du médecin. D'autres questionnaires/ outils peuvent également être disponibles et appropriés selon le jugement professionnel du médecin.

Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9)*

		Pas du tout	Plusieurs jours	Plus de la moitié des jours	Presque chaque jour
1	Au cours des deux dernières semaines, combien de fois avez-vous été gêné par l'un des problèmes suivants ?	(0 point)	(1 point)	(2 points)	(3 points)
a	Peu d'intérêt ou de plaisir à faire des choses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	Sentiment d'abattement, de dépression ou de désespoir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	Difficultés à s'endormir ou à rester endormi, sommeil excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	Sensation de fatigue ou manque d'énergie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	Manque d'appétit ou suralimentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f	Vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez l'impression d'avoir échoué ou encore de vous abandonner vous-même ou votre famille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g	Difficulté à se concentrer sur certaines choses, comme lire le journal ou regarder la télévision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h	Se déplacer ou parler si lentement que d'autres personnes auraient pu le remarquer. Ou au contraire, vous êtes tellement agité que vous vous déplacez beaucoup plus que d'habitude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i	Pensées selon lesquelles il vaudrait mieux mourir ou se faire du mal d'une certaine manière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Pas difficile du tout	Plutôt difficile	Très difficile	Extrêmement difficile
2	Si vous avez coché l'un des problèmes mentionnés dans ce questionnaire jusqu'à présent, dans quelle mesure ces problèmes vous ont-ils empêché de travailler, de vous occuper de vos affaires à la maison ou de vous entendre avec d'autres personnes ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide de notation et d'interprétation du PHQ-9 (à l'usage des médecins uniquement)

<p>Notation :</p> <p>Comptez le nombre (#) de cases cochées dans la section 1. Multipliez ce nombre par la valeur indiquée ci-dessous, puis additionnez les sous-totaux pour obtenir un score total. La gamme possible est de 0 à 27.</p> <p>Utilisez le tableau de droite pour interpréter le score PHQ-9.</p> <p>Pas du tout (#) _____ x 0 = _____</p> <p>Plusieurs jours (#) _____ x 1 = _____</p> <p>Plus de la moitié des jours (#) _____ x 2 = _____</p> <p>Presque chaque jour (#) _____ x 3 = _____</p> <p>Score total : _____</p>	<p>Interprétation des scores du PHQ-9</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interprétation des scores du PHQ-9</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dépression minimale</td> <td>0-4</td> </tr> <tr> <td>Dépression légère</td> <td>5-9</td> </tr> <tr> <td>Dépression modérée</td> <td>10-14</td> </tr> <tr> <td>Dépression modérément sévère</td> <td>15-19</td> </tr> <tr> <td>Dépression sévère</td> <td>20-27</td> </tr> </tbody> </table>	Interprétation des scores du PHQ-9	Score	Dépression minimale	0-4	Dépression légère	5-9	Dépression modérée	10-14	Dépression modérément sévère	15-19	Dépression sévère	20-27
Interprétation des scores du PHQ-9	Score												
Dépression minimale	0-4												
Dépression légère	5-9												
Dépression modérée	10-14												
Dépression modérément sévère	15-19												
Dépression sévère	20-27												

*Développé par les Drs Robert L Spitzer, Janet BW Williams, et Kurt Kroenke et leurs collègues, avec une subvention éducative de Pfizer Inc.



ABSORICA LD et C-A-R-E sont des marques déposées de Sun Pharma ou de ses sociétés affiliées et filiales. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2023 Sun Pharma, ou ses filiales et sociétés affiliées. Tous droits réservés.

